


Episode ツミビト 2-5

Data

- [患　部] 肝臓
- [バイタル] 80(99)
- [手術時間] 05:00:00
- [超執刀] 使用可能



ギルス変異腫を植えつけられた過去を持つ少年「ツミビト」の手術を行なう。肝臓の損傷部をガーゼパッキングの処置法で進めつつ、臓器の損傷部を治療する。

The patient's Life is in your hands !

1. 切開　E・N 04:54:59　H 04:58:00
腹部を消毒して切開(切開→P34)
2. 肝臓の処置1　E・N 04:32:20　H 04:47:28
心停止イベント後、カウンターショックで心拍を復活させる
3. 鎮静薬(黒色の液体)を投与して中毒症を沈静化させる(中毒症→P40)
4. バイタルを60付近まで回復する(バイタル回復→P33)
5. 破損部分の血だまりをすべて吸引(ガーゼパッキング→P40)
6. 追加トレイにある人工膜をすべての破損部分に配置し、定着させる(ガーゼパッキング→P40)
7. 病状が悪化し、破損部分から血だまりが吹き出すイベントが発生
8. 肝臓の処置2　E・N 04:00:00　H 04:26:00
肝臓右上に発生している内出血×4をまとめて切開(内出血→P39)
9. 内出血の血だまり×4を吸引し、切開口×4を縫合(内出血→P39)
10. 鎮静薬(黒色の液体)を投与して中毒症を沈静化させる(中毒症→P40)
11. 肝臓左下に発生している内出血×2をまとめて切開(内出血→P39)
12. 内出血の血だまり×2を吸引し、切開口×2を縫合(内出血→P39)
13. 肝臓の破損部分に発生している血だまりをすべて吸引(ガーゼパッキング→P40)
14. 心細動の前兆が起きる(心細動→P39)
15. 肝臓の破損部分に発生している血だまりをすべて吸引(ガーゼパッキング→P40)
16. 追加トレイにある人工膜をすべての破損部分に配置し、定着させる(ガーゼパッキング→P40)
17. 閉創　E・N 03:43:33　H 04:22:51
切開した部位の閉創処置を行なう(閉創→P35)

The patient is saved !




6

人工膜は同じ場所に配置しても自動でほかの場所に張られる。処置スピードを上げるため、同じ場所に置こう。




9

HARDではバイタルの低下が激しく、素早い処置スピードが要求される。超執刀を使って進めてもいい。



14

心電図が安定するまで手を休めるよう。器具を扱うと「Miss」になり、心停止になってしまう。



15

すべての破裂部分から血だまりが発生したのを確認してから吸引し、血だまりの発生タイミングを揃えよう。

SPECIAL BONUS

No	SPECIAL BONUS 獲得条件	EASY	NORMAL	HARD	獲得スコア
1	Miss 判定無し				700
2	○○○秒以上残して手術終了　※	120	180	240	600
3	MAX CHAIN　○○○以上	38	48	58	300
4	剥がれた人工膜の枚数○○枚以下	5	3	1	400

※分表示では、EASYが2:00、NORMALが3:00、HARDが4:00

OPERATION RANK


ランク	スコア
C	3300 未満
B	3300 ~ 4399
A	4400 ~ 5199
S	5200 ~ 5599
XS	5600 以上



Episode 再生 2-6

Data

- [患　部] 肝臓
- [バイタル] 30(40)
- [手術時間] 05:00:00
- [超執刀] 使用可能



肝臓の修復が進まないため、「ツミビト」の肝臓移植を行なうエピソード。移植後にキラル反応が検出され、新種のギルスを除去することになる。

The patient's Life is in your hands !

1. 肝臓の処置1　E・N 04:23:41　H 04:24:71
静脈(青色の血管)に収縮剤(灰色の液体)を投与し、ガイドラインに沿って切開(肝臓移植→P41)
2. 静脈の血だまりを吸引し、管を接合して接合部分を縫合(肝臓移植→P41)
3. 術野が左下に移動する
4. 門脈(黄色の血管)に収縮剤(灰色の液体)を投与し、ガイドラインに沿って切開(肝臓移植→P41)
5. 門脈の血だまりを吸引し、管を接合して接合部分を縫合(肝臓移植→P41)
6. 術野が右下に移動する
7. バイタルを50前後まで回復(バイタル回復→P33)
8. 動脈(赤色の血管)に収縮剤(灰色の液体)を2回投与し、ガイドラインに沿って切開(肝臓移植→P41)
9. 動脈の血だまりを吸引し、管を接合して接合部分を縫合(肝臓移植→P41)
10. 術野が左に移動する
11. 管脈(緑色の血管)に収縮剤(灰色の液体)を投与し、ガイドラインに沿って切開(肝臓移植→P41)
12. 管脈の血だまりを吸引し、管を接合して接合部分を縫合(肝臓移植→P41)
13. 術野が肝臓部に移動する
14. 肝臓の処置2　E・N 02:39:99　H 02:37:19
ヌースの腫瘍が発生しているときにバイタルを回復(バイタル回復→P33)
15. 最初に発生した腫瘍の組織液を吸引し、ガイドラインに沿って切開(ヌース→P50)
16. ⑮の手順で、残りの腫瘍を発生した順に処置(ヌース→P50)
17. 切り離した腫瘍をまとめて回収(ヌース→P50)
18. ヌース本体の組織液を吸引し、ガイドラインに沿って切開(ヌース→P50)
19. ⑭~⑱の手順で、3つの腫瘍を回収し、ヌース本体を切開する(ヌース→P50)
20. ⑭~⑱の手順で、4つの腫瘍を回収し、ヌース本体を切開する(ヌース→P50)
21. ⑭~⑱の手順で　4つの腫瘍を回収し、ヌース本体を切開する(ヌース→P50)
22. ⑭~⑱の手順で、5つの腫瘍を回収し、ヌース本体を切開する(ヌース→P50)
23. 閉創　E・N 02:31:81　H 02:30:65
切開した部位の閉創処置を行なう(閉創→P35)

The patient is saved !



14

腫瘍が発生しているあいだは処置ができないため、腫瘍の発生した順番を覚えつつ、バイタルを回復しよう。



17

切り離した腫瘍は発生した順番で回収する必要はない。回収しやすい腫瘍から除去していこう。

SPECIAL BONUS

No	SPECIAL BONUS 獲得条件	EASY	NORMAL	HARD	獲得スコア
1	Miss 判定無し				400
2	○○○秒以上残して手術終了　※1	90	120	150	700
3	MAX CHAIN　○○○以上	50	70	80	600
4	腫瘍の破裂個数が○○回以下　※2	3	2	1	300

※1……分表示では、EASYが1:30、NORMALが2:00、HARDが2:30　※2……ヌースが生み出した腫瘍の破裂個数

OPERATION RANK

ランク	スコア
C	5100 未満
B	5100 ~ 5799
A	5800 ~ 6499
S	6500 ~ 7099
XS	7100 以上